

# 环状有界的 Small Nim 博弈

刘文安, 周晶晶

(河南师范大学 数学与信息科学学院 河南 新乡 453007)

**摘要:**提出了一种新的“环状有界的 Small Nim”模型,确定出该模型在 Normal 规则下的所有  $P$  位置,从而彻底解决了该模型.

**关键词:**公平组合博弈;有界;Small Nim

**中图分类号:**O225

**文献标志码:**A

传统的公平组合博弈有两种输赢规则:在 Normal 规则下,第一个无法移动的参与者输(他的对手赢);在 Misere 规则下,第一个无法移动的参与者赢(他的对手输).一个位置称为“ $P$  位置”如果参与者从这个位置出发采用任何策略都无法赢得比赛;一个位置称为“ $N$  位置”如果参与者从这个位置出发存在一种策略能够赢得比赛.传统的公平组合博弈有多种模型,Nim 模型是其中一个,具体请读者参考文献 [1-6].Small Nim 是 Nim 模型的一个变化,它可以描述为:有  $s$  堆金币  $(a_1, a_2, \dots, a_s)$ ,两个参与者  $A_1$  和  $A_2$  轮流进行游戏,每个参与者每次必须从最小堆移走金币(至少一个,可以整堆).Nim 模型有很多扩展情形<sup>[7-9]</sup>和限制情形<sup>[10-12]</sup>.本文提出一种新的“环状有界的 Small Nim”模型,它是 Small Nim 的一种限制模型.本文确定出该模型在 Normal 规则下的所有  $P$  位置,从而彻底解决了该模型.

**定义 1** 给定 3 个整数  $s \geq 0$  及  $B > b \geq 1$ . 所谓“环状有界的 Small Nim”(用  $S_N(s; b, B)$  表示)是指:有  $s$  堆金币  $(a_1, a_2, \dots, a_s)$ ,两个参与者  $A_1$  和  $A_2$  轮流进行游戏,每个参与者每次必须从最小堆移走  $t$  个金币,这里  $b \leq t \leq B$ (显然  $t$  不能大于最小堆金币的数量).第一个无法移动的参与者输,即采用 Normal 规则.

$S_N(s; b, B)$  模型中一个“位置”可以用  $\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_s)$  表示,这里  $a_i$  满足  $1 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_s$ ,因为游戏过程中金币个数为 0 的堆可以被移除.根据定义 1,从一个给定位置  $\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_s)$  出发,任何合法移动必然使得  $\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_s) \rightarrow \sigma' = (a'_1, a_2, \dots, a_s)$ ,其中  $a'_1 = a_1 - t$  且  $b \leq t \leq \min\{B, a_1\}$ .

**定义 2** 给定  $S_N(s; b, B)$  中一个位置  $\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_s)$ ,定义:

(1) 对任意  $1 \leq j \leq s$ ,令  $r_j := B_{B+b}(a_j)$ ,其中  $R_{B+b}(a_j)$  表示  $a_j$  除以  $B+b$  的余数.称  $r(\sigma) = (r_1, r_2, \dots, r_s)$  为位置  $\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_s)$  的余数向量.(2) 令  $\alpha(\sigma) = \max\{1 \leq k \leq s-1 \mid r_j \in \{0, b\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, k\}\}$ .特别地,当  $r_1 \notin \{0, b\}$  时  $\alpha(\sigma) = 0$ .(3) 令  $\beta(\sigma)$  表示整数  $b$  在向量  $(r_1, r_2, \dots, r_{\alpha(\sigma)})$  中出现的次数.特别地,如果  $\alpha(\sigma) = 0$  那么  $\beta(\sigma) = 0$ .

例如,固定  $B = t, b = 1, s = 5$ .对  $\sigma_1 = (1, 7, 13, 14, 19)$ ,有  $r(\sigma_1) = (1, 1, 1, 2, 1), \alpha(\sigma_1) = 3 = \beta(\sigma_1)$ ;对  $\sigma_2 = (1, 7, 12, 13, 20)$ ,有  $r(\sigma_2) = (1, 1, 0, 1, 2), \alpha(\sigma_2) = 4, \beta(\sigma_2) = 3$ ;对  $\sigma_3 = (8, 12, 13, 19, 25)$ ,有  $r(\sigma_3) = (2, 0, 1, 1, 1), \alpha(\sigma_3) = 0 = \beta(\sigma_3)$ .

根据定义 2,给定一个位置  $\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_s)$ ,有  $0 \leq \alpha(\sigma) \leq \beta(\sigma) \leq s-1$ ,且对所有的  $j \in \{1, 2, \dots, \alpha(\sigma)\}$  均有  $r_j \in \{0, b\}$ .特别地,  $r_{\alpha(\sigma)+1} \notin \{0, b\}$ .

给定整数  $s \geq 0$ ,用  $P_s$  表示  $S_N(s; b, B)$  模型下所有的  $P$  位置集合.任何合法移动必然使得  $\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_s) \rightarrow \sigma' = (a'_1, a_2, \dots, a_s)$ ,其中  $a'_1 = a_1 - t$  且  $b \leq t \leq \min\{B, a_1\}$ .如果  $a'_1 = 0$ ,则  $\sigma'$  有  $s-1$  堆

收稿日期:2017-06-13;修回日期:2017-12-25.

基金项目:国家自然科学基金(11171368);河南师范大学研究生创新基金(YL201601).

作者简介(通信作者):刘文安(1964-),男,河南偃师人,河南师范大学教授,博士,研究方向为随机模型,E-mail:liuwenan@126.com.

金币;如果  $a'_1 > 0$ , 则  $\sigma'$  有  $s$  堆金币. 需要证明两个事实.

事实 1 对于属于  $P_s$  的任何一个位置  $u$ , 它的任意选择都不属于  $P_s \cup P_{s-1}$ .

事实 2 对于不属于  $P_s$  的任何一个位置  $u$ , 存在一个合法移动使得  $u \rightarrow v \in P_s \cup P_{s-1}$ .

## 1 主要定理及证明

**定理 1** 考虑  $S_N(s; b, B)$ , (1) 当  $s = 0$  时, 即  $P_0 = \{(0)\}$  空堆是一个  $P$  位置; (2) 当  $s = 1$  时,  $P_1 = \bigcup_{1 \leq a_1} \{(a_1) \mid r_1 \in \{0, 1, \dots, b-1\}\}$ .

**证明** (1) 如果  $s = 0$ , 则从  $\sigma = (0)$  出发无法进行合法移动, 故为  $P$  位置.

(2) 当  $s = 1$  时, 需要证明它满足事实 1 和事实 2.

事实 1 假设  $\sigma = (a_1) \in P_1$ , 令  $a_1 = m(B+b) + r_1 > 0 (m \geq 0)$ . 当  $m = 0$  时有  $1 \leq a_1 < b$ , 显然参与者无法进行合法移动, 因此  $\{\sigma = (a_1) \mid 1 \leq a_1 < b\}$  是  $P$  位置. 当  $m > 0$  时, 任何合法移动使得  $\sigma = (a_1) \rightarrow \sigma' = (a_1 - t)$ , 这里  $b \leq t \leq \min\{B, a_1\} < B + b$ , 此时  $r'_1 = R_{B+b}(a_1 - t) = R_{(B+b)}(m(B+b) + r_1 - t) \in \{b, b+1, \dots, B+b+1\}$ , 所以  $\sigma' \notin P_1$ .

事实 2 假设  $\sigma = (a_1) \notin P_1$ , 则  $r_1 \in \{b, b+1, \dots, B+b-1\}$ . 当  $r_1 \in \{b, b+1, \dots, B\}$  时, 存在一种合法移动  $\sigma = (a_1) \rightarrow \sigma' = (a_1 - r_1)$  使得  $r'_1 = 0$ , 因此  $\sigma' \in P_1 \cup P_0$ ; 当  $r_1 \in \{B, B+1, \dots, B+b-1\}$  时, 存在一种合法移动  $\sigma = (a_1) \rightarrow \sigma' = (a_1 - B)$  使得  $r'_1 \in \{0, 1, \dots, b-1\}$ , 因此  $\sigma' \in P_1 \cup P_0$ .

对于  $s \geq 2$ , 为了求出  $P_s$ , 用  $Z^o$  和  $Z^e$  分别表示所有奇、偶自然数集合, 即  $Z^o = \{2n+1 \mid n \geq 0\}$  和  $Z^e = \{2n \mid n \geq 0\}$ .

**定理 2** 对于任何  $s \geq 2$ , 有  $P_s = M_1(s) \cup M_2(s) \cup M_3(s) \cup M_4(s)$ , 这里,

$$M_1(s) = \{\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_s) \mid \alpha(\sigma) = s-1, \beta(\sigma) \in Z^e, 0 \leq r_s < b\},$$

$$M_2(s) = \{\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_s) \mid \alpha(\sigma) = s-1, \beta(\sigma) \in Z^o, b \leq r_s < B+b\},$$

$$M_3(s) = \{\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_s) \mid 0 \leq \alpha(\sigma) < s-1, \beta(\sigma) \in Z^e, 1 \leq r_{\alpha(\sigma)+1} < b\},$$

$$M_4(s) = \{\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_s) \mid 0 < \alpha(\sigma) < s-1, \beta(\sigma) \in Z^o, b \leq r_{\alpha(\sigma)+1} < B+b\}.$$

**证明** 需要证明它满足事实 1 和事实 2.

事实 1 假设  $\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_s) \in P_s$ , 分成两种不同的情况讨论:  $\alpha(\sigma) = 0$  或  $1 \leq \alpha(\sigma) \leq s-1$ :

(1)  $\alpha(\sigma) = 0$  此时只能有  $\sigma \in M_3(s)$  而且  $1 \leq r_1 < b$ . 令  $a_1 = n_1(B+b) + r_1$  其中  $n_1 \geq 0, 1 \leq r_1 < b$ . 如果  $n_1 = 0$ , 则  $a_1 = r_1 \in \{1, 2, \dots, b-1\}$ , 参与者无法进行合法移动. 如果  $n_1 > 0$ , 则  $a_1 > B+b > t$  且  $a'_1 = a_1 - t = (n_1 - 1)(B+b) + B+b + r_1 - t > 0$ . 因此  $\sigma' \notin P_{s-1}$ . 注意到  $b+1 \leq r'_1 = R_{B+b}(a'_1) \leq B+b-1$ , 知  $\alpha(\sigma') = \beta(\sigma') = 0$ , 进一步可得  $\sigma' \notin M_1(s) \cup M_2(s) \cup M_4(s)$ . 由  $r_{\alpha(\sigma')+1} = r'_1 > b$  知  $\sigma' \notin M_3(s)$ . 因此  $\sigma' \notin P_{s-1} \cup P_s$ .

(2)  $1 \leq \alpha(\sigma) \leq s-1$ , 此时  $r_1 \in \{0, b\}$ , 令  $a_1 = n_1(B+b) + r_1$  其中  $n_1 \geq 0, r_1 \in \{0, b\}$ .

(2.1) 考虑  $r_1 = 0$  且  $n_1 > 0$ . 此时  $a_1 = n_1(B+b)$ , 进而  $r'_1 = B+b-t \in \{b, b+1, \dots, B\}$ . 因此  $\sigma'$  有  $s$  堆, 即  $\sigma' \notin P_{s-1}$ . 如果  $r'_1 \in \{b+1, b+2, \dots, B\}$  则  $\alpha(\sigma') = \beta(\sigma') = 0$ . 进一步得由  $r_{\alpha(\sigma')+1} = r'_1 > b$  知  $\sigma' \notin M_3(s)$ ; 由  $\alpha(\sigma') = \beta(\sigma') = 0$  知  $\sigma' \notin M_1(s) \cup M_2(s) \cup M_4(s)$ . 因此  $\sigma' \notin P_s$ .

如果  $r'_1 = b$  则  $\alpha(\sigma') = \alpha(\sigma), \beta(\sigma') = \beta(\sigma) + 1$ . 为了讨论方便, 做以下分析, 进而得到  $\sigma' \notin P_s$ .

当  $\sigma \in M_1(s) \cup M_2(s)$  时, 有  $\alpha(\sigma') = \alpha(\sigma) = s-1$  即  $\sigma' \notin M_3(s) \cup M_4(s)$ . 分别考虑若  $\sigma \in M_1(s)$  则  $\beta(\sigma') = \beta(\sigma) + 1$  是奇数, 而且  $0 \leq r_s < b$ , 即  $\sigma' \notin M_1(s) \cup M_2(s)$ ; 若  $\sigma \in M_2(s)$  则  $\beta(\sigma') = \beta(\sigma) + 1$  是偶数, 而且  $b \leq r_s < B+b$ , 即  $\sigma' \notin M_1(s) \cup M_2(s)$ .

当  $\sigma \in M_3(s) \cup M_4(s)$  时, 有  $1 \leq \alpha(\sigma') = \alpha(\sigma) < s-1$  即  $\sigma' \notin M_1(s) \cup M_2(s)$ . 同样地, 分别考虑若  $\sigma \in M_3(s)$  则  $\beta(\sigma') = \beta(\sigma) + 1$  是奇数, 且  $r_{\alpha(\sigma')+1} = r_{\alpha(\sigma)+1} < b$ , 即  $\sigma' \notin M_3(s) \cup M_4(s)$ ; 若  $\sigma \in M_4(s)$  则  $\beta(\sigma') = \beta(\sigma) + 1$  是偶数, 且  $r_{\alpha(\sigma')+1} = r_{\alpha(\sigma)+1} > b$ , 即  $\sigma' \notin M_3(s) \cup M_4(s)$ .

(2.2)  $r_1 = b$  而且  $n_1 \geq b$ . 分成两种不同的情况讨论.

(2.2.1)  $r_1 = b$  而且  $n_1 = 0$ . 此时  $a_1 = t = b$ , 位置  $\sigma' = (a_2, a_3, \dots, a_s)$  有  $s' = s-1$  堆. 显然  $\sigma' \notin P_s$ . 注意

到  $r(\sigma') = (r_2, r_3, \dots, r_s)$ , 因此  $\alpha(\sigma') = \alpha(\sigma) - 1, \beta(\sigma') = \beta(\sigma) - 1$ . 为了讨论方便, 做以下分析.

当  $\sigma \in M_1 \cup M_2(s)$  则  $\alpha(\sigma') = \alpha(\sigma) - 1 = s' - 1$ , 显然  $\sigma' \notin M_3(s') \cup M_4(s')$ . 分别考虑若  $\sigma \in M_1(s)$  则  $\beta(\sigma') = \beta(\sigma) - 1$  是奇数, 而且  $\sigma'$  中最后一个元素的余数为  $r_s \in \{0, 1, \dots, b - 1\}$ , 即  $\sigma' \notin M_1(s') \cup M_2(s')$ ; 若  $\sigma \in M_2(s)$  则  $\beta(\sigma') = \beta(\sigma) - 1$  是偶数, 而且  $r_s \in \{b, b + 1, \dots, B + b - 1\}$ , 即  $\sigma' \notin M_1(s') \cup M_2(s')$ . 因此  $\sigma' \notin P_{s-1}$ .

当  $\sigma \in M_3(s) \cup M_4(s)$ , 则  $1 \leq \alpha(\sigma) < s - 1$ . 不得不进一步分两种情况讨论: 如果  $\alpha(\sigma) = 1$ , 则  $\alpha(\sigma') = \alpha(\sigma) - 1 = 0$ , 即  $\sigma' \notin M_1(s') \cup M_2(s') \cup M_4(s')$ ; 如果  $1 < \alpha(\sigma) < s - 1$ , 则  $1 \leq \alpha(\sigma') = \alpha(\sigma) - 1 < s' - 1$ , 即  $\sigma' \notin M_1(s') \cup M_2(s')$ . 同样地, 分别考虑若  $\sigma \in M_3(s)$  则  $\beta(\sigma') = \beta(\sigma) - 1$  是奇数, 且  $r_{\alpha(\sigma')+1} = r_{\alpha(\sigma)+1} < b$ , 即  $\sigma' \notin M_3(s') \cup M_4(s')$ ; 若  $\sigma \in M_4(s)$  则  $\beta(\sigma') = \beta(\sigma) - 1$  是偶数, 且  $r_{\alpha(\sigma')+1} = r_{\alpha(\sigma)+1} > b$ , 即  $\sigma' \notin M_3(s') \cup M_4(s')$ . 因此  $\sigma' \notin P_{s-1}$ .

(2.2.2)  $r_1 = b$  而且  $n_1 > 0$ . 此时  $a_1 = n_1(B + b) + b > B, b \leq t \leq B$ . 因此  $a'_1 = (n_1 - 1)(B + b) + B + 2b - t \geq 2b, r'_1 = R_{B+b}(a'_1) \in \{0, 2b, 2b + 1, \dots, B + b - 1\}$ . 位置  $\sigma' = (a'_1, a_2, a_3, \dots, a_s)$  有  $s$  堆, 因此  $\sigma' \notin P_{s-1}$ . 同时有  $r(\sigma') = (r'_1, r_2, r_3, \dots, r_s)$ . 如果  $r'_1 \in \{2b, 2b + 1, \dots, B + b - 1\}$  则  $\alpha(\sigma') = 0$ , 即  $\sigma' \notin M_1(s) \cup M_2(s) \cup M_4(s)$ . 由  $r_{\alpha(\sigma')+1} = r'_1 > b$  知  $\sigma' \notin M_3(s)$ . 因此  $\sigma' \notin P_s$ .

如果  $r'_1 = 0$  则  $\alpha(\sigma') = \alpha(\sigma), \beta(\sigma') = \beta(\sigma) - 1$ . 为了讨论方便, 做以下分析.

当  $\sigma \in M_1(s) \cup M_2(s)$ , 则  $\alpha(\sigma') = \alpha(\sigma) = s - 1$ , 显然  $\sigma' \notin M_3(s) \cup M_4(s)$ . 分别考虑如果  $\sigma \in M_1(s)$  则  $\beta(\sigma') = \beta(\sigma) - 1$  是奇数, 而且  $\sigma'$  中最后一个元素的余数为  $r_s \in \{0, 1, \dots, b - 1\}$ , 即  $\sigma' \notin M_1(s) \cup M_2(s)$ ; 如果  $\sigma \in M_2(s)$  则  $\beta(\sigma') = \beta(\sigma) - 1$  是偶数, 而且  $\sigma'$  中最后一个元素的余数为  $r_s \in \{b, b + 1, \dots, B + b - 1\}$  即  $\sigma' \notin M_1(s) \cup M_2(s)$ . 因此  $\sigma' \notin P_s$ .

当  $\sigma' \in M_3(s) \cup M_4(s)$ , 则  $1 \leq \alpha(\sigma') = \alpha(\sigma) < s - 1$ , 即  $\sigma' \notin M_1(s) \cup M_2(s)$ . 同样地, 分别考虑如果  $\sigma \in M_3(s)$  则  $\beta(\sigma') = \beta(\sigma) - 1$  是奇数, 且  $r_{\alpha(\sigma')+1} = r_{\alpha(\sigma)+1} < b$ , 即  $\sigma' \notin M_3(s) \cup M_4(s)$ ; 如果  $\sigma \in M_4(s)$  则  $\beta(\sigma') = \beta(\sigma) - 1$  是偶数, 且  $r_{\alpha(\sigma')+1} = r_{\alpha(\sigma)+1} > b$ , 即  $\sigma' \notin M_3(s) \cup M_4(s)$ . 因此  $\sigma' \notin P_s$ .

事实 2 对任意位置  $\nu = (a_1, a_2, \dots, a_s) \notin P_s$ , 则  $\nu \in T_1 \cup T_2 \cup T_3 \cup T_4$ , 这里  $T_1(s) = \{\nu \mid \alpha(\nu) = s - 1, \beta(\nu) \in Z^e, b \leq r_s \leq B + b - 1\}, T_2(s) = \{\nu \mid \alpha(\nu) = s - 1, \beta(\nu) \in Z^o, 0 \leq r_s \leq b - 1\}, T_3(s) = \{\nu \mid 0 \leq \alpha(\nu) < s - 1, \beta(\nu) \in Z^e, b < r_{\alpha(\nu)+1} \leq B + b - 1\}, T_4(s) = \{\nu \mid 0 < \alpha(\nu) < s - 1, \beta(\nu) \in Z^o, 1 \leq r_{\alpha(\nu)+1} \leq b\}$ .

分成两种不同的情况讨论:  $\alpha(\nu) = 0$  或  $1 \leq \alpha(\nu) \leq s - 1$ .

(1)  $\alpha(\nu) = 0$ . 此时  $\nu \in T_3(s), \beta(\nu) = 0, r_1 \in \{b + 1, b + 2, \dots, B + b - 1\}$ .

(1.1) 当  $r_1 \in \{b + 1, b + 2, \dots, B\}$ , 存在一种合法移动  $a_1 \rightarrow a_1 - (r_1 - 1)$  使得  $\nu \rightarrow \nu' = (a_1 - (r_1 - 1), a_2, \dots, a_s)$ . 由  $r'_1 = R_{B+b}(a_1 - (r_1 - 1)) = 1 \notin \{0, b\}$  得  $\alpha(\nu') = \beta(\nu') = 0$ . 因此  $r_{\alpha(\nu')+1} = r'_1 = 1 < b$ , 故  $\nu' \in M_3(s)$ . (1.2) 当  $r_1 \in \{B + 1, B + 2, \dots, B + b - 1\}$ , 存在一种合法移动  $a_1 \rightarrow a_1 - B$  使得  $\nu \rightarrow \nu' = (a_1 - B, a_2, \dots, a_s)$ . 注意到  $r'_1 = R_{B+b}(a_1 - B) \in \{1, 2, \dots, b - 1\}$  即  $\alpha(\nu') = \beta(\nu') = 0$ . 因此  $1 \leq r_{\alpha(\nu')+1} = r'_1 < b$ , 故  $\nu' \in M_3(s)$ .

(2)  $1 \leq \alpha(\nu) \leq s - 1$ . 此时  $r_1 \in \{0, b\}$ . 令  $a_1 = n_1(B + b) + r_1, n_1 \geq 0, r_1 \in \{0, b\}$ .

(2.1) 考虑  $r_1 = 0$  且  $n_1 > 0$ . 此时  $a_1 = n_1(B + b) > B$ , 存在一种合法移动  $a_1 \rightarrow a_1 - B$  使得  $\nu \rightarrow \nu' = (a_1 - B, a_2, \dots, a_s)$ . 注意到  $r(\nu') = (r'_1, r_2, r_3, \dots, r_s)$  且  $r'_1 = R_{B+b}(a_1 - B) = b$ , 故  $\alpha(\nu') = \alpha(\nu), \beta(\nu') = \beta(\nu) + 1$ . 如果  $\nu \in T_1(s)$ , 那么  $\alpha(\nu') = \alpha(\nu) = s - 1, \beta(\nu') = \beta(\nu) + 1 \in Z^o$  而且  $\nu'$  中最后一个元素的余数为  $r_s \in \{b, b + 1, b + 2, \dots, B + b - 1\}$ , 故  $\nu' \in M_2(s)$ ; 如果  $\nu \in T_2(s)$ , 则  $\alpha(\nu') = \alpha(\nu) = s - 1, \beta(\nu') = \beta(\nu) + 1 \in Z^e$ , 而且  $r_s \in \{0, 1, 2, \dots, b - 1\}$ , 故  $\nu' \in M_1(s)$ ; 如果  $\nu \in T_3(s)$ , 有  $1 \leq \alpha(\nu') = \alpha(\nu) < s - 1, \beta(\nu') = \beta(\nu) + 1 \in Z^o$ , 而且  $b < r_{\alpha(\nu')+1} = r_{\alpha(\nu)+1} < B + b$ , 故  $\nu' \in M_4(s)$ ; 若  $\nu \in T_4(s)$ , 则  $1 \leq \alpha(\nu') = \alpha(\nu) < s - 1, \beta(\nu') = \beta(\nu) + 1 \in Z^e$ , 而且  $1 \leq r_{\alpha(\nu')+1} = r_{\alpha(\nu)+1} < b$ , 故  $\nu' \in M_3(s)$ .

(2.2)  $r_1 = b$  而且  $n_1 \geq 0$ . 此时  $a_1 = n_1(B + b) + b$ . 存在一种合法移动  $a_1 \rightarrow a_1 - b$  使得  $\nu \rightarrow \nu' = (a_1 - b, a_2, \dots, a_s)$ . 有必要分以下两种情况讨论.

(2.2.1)  $r_1 = b$  而且  $n_1 = 0$ . 此时  $\nu' = (a_2, a_3, \dots, a_s)$  有  $s' = s - 1$  堆. 注意到  $r(\nu') = (r_2, r_3, \dots, r_s)$ , 因此

$\alpha(\nu') = \alpha(\nu) - 1, \beta(\nu') = \beta(\nu) - 1$ . 如果  $\nu \in T_1(s)$ , 则  $\alpha(\nu') = \alpha(\nu) - 1 = s' - 1, 1 \leq \beta(\nu') = \beta(\nu) - 1 \in Z^o$ , 而且  $r_s \in \{b, b+1, b+2, \dots, B+b-1\}$ . 因此  $\nu' \in M_2(s-1)$ ; 如果  $\nu \in T_2(s)$ , 那么  $\alpha(\nu') = \alpha(\nu) - 1 = s' - 1, 0 \leq \beta(\nu') = \beta(\nu) - 1 \in Z^e$  而且  $r_s \in \{0, 1, \dots, b-1\}$ . 因此  $\nu' \in M_1(s-1)$ ; 若  $\nu \in T_3(s)$  则  $0 < \alpha(\nu') = \alpha(\nu) - 1 < s' - 1, 1 \leq \beta(\nu') = \beta(\nu) - 1 \in Z^o$  且  $r_{\alpha(\nu')+1} = r_{\alpha(\nu)+1} \in \{b+1, b+2, \dots, B+b-1\}$ , 故  $\nu' \in M_4(s-1)$ ; 如果  $\nu \in T_4(s)$  那么  $0 \leq \alpha(\nu') = \alpha(\nu) < s-1, \beta(\nu') = \beta(\nu) - 1 \in Z^e$  而且  $1 \leq r_{\alpha(\nu')+1} = r_{\alpha(\nu)+1} < b$ , 故  $\nu' \in M_3(s-1)$ .

(2.2.2)  $r_1 = 1$  而且  $n_1 > 0$ . 此时  $\nu' = (a_1 - b, a_2, a_3, \dots, a_s)$  有  $s$  堆. 注意到  $r(\sigma') = (r'_1, r_2, r_3, \dots, r_s)$  且  $r'_1 = R_{B+b}(a_1 - b) = 0$ , 因此  $\alpha(\nu') = \alpha(\nu), \beta(\nu') = \beta(\nu) - 1$ .

如果  $\nu \in T_1(s)$ , 则  $\alpha(\nu') = \alpha(\nu) = s-1, \beta(\nu') = \beta(\nu) - 1 \in Z^o$ , 而且  $r_s \in \{b, b+1, b+2, \dots, B+b-1\}$ , 故  $\nu' \in M_2(s)$ ; 若  $\nu \in T_2(s)$  则  $\alpha(\nu') = \alpha(\nu) = s-1$  并且  $\beta(\nu') = \beta(\nu) - 1 \in Z^e$  及  $r_s \in \{0, 1, \dots, b-1\}$ , 故  $\nu' \in M_1(s)$ ; 如果  $\nu \in T_3(s)$  那么  $0 < \alpha(\nu') = \alpha(\nu) < s-1$  且  $\beta(\nu') = \beta(\nu) - 1 \in Z^o$  以及  $r_{\alpha(\nu')+1} = r_{\alpha(\nu)+1} \in \{b+1, b+2, \dots, b+B-1\}$ , 故  $\nu' \in M_4(s)$ ; 若  $\nu \in T_4(s)$  则  $0 < \alpha(\nu') = \alpha(\nu) < s-1$  以及  $\beta(\nu') = \beta(\nu) - 1 \in Z^e$  而且  $1 \leq r_{\alpha(\nu')+1} = r_{\alpha(\nu)+1} < b$ , 故  $\nu' \in M_3(s)$ .

## 2 结 论

本文提出了一种新的“环状有界的 Small Nim”模型  $S_N(s; b, B)$ , 针对参数  $B > b \geq 1$  以及  $s \geq 1$ , 确定出该模型在 Normal 规则下的所有  $P$  位置. 特别地, 当下界  $b=1$  时, 所有  $P$  位置形成的集合具有更简单的结构; 当  $s=1$  时,  $P_1 = \bigcup_{1 \leq a_1} \{(a_1) \mid r_1 = 0\}$  即  $a_1$  是  $B+1$  的整倍; 当  $s \geq 2$  时, 有  $P_s$  满足定理 2.

## 参 考 文 献

- [1] 范如国, 韩民春. 博弈论[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2006.
- [2] 张影. 博弈论的智慧[M]. 北京: 中国致公出版社, 2009.
- [3] 邬锐. 博弈论在戏剧冲突中的应用研究[D]. 上海: 上海戏剧学院, 2013.
- [4] 白波, 郭兴文. 博弈关于策略的 63 个有趣话题[M]. 哈尔滨: 哈尔滨出版社, 2005.
- [5] 郑延斌, 陶雪丽. 基于博弈论及惩罚机制的多 Agent 协作控制算法[J]. 河南师范大学学报(自然科学版), 2015, 43(6): 85-185.
- [6] Bouton C L. Nim, a game with a complete mathematical theory [J]. Ann Math, 1905, 3: 35-39.
- [7] Fraenkel A S. New games related to old and new sequences [J]. Applied Mathematics, 2004, 4: 1-18.
- [8] Allen M R. Impartial Combinatorial Misere game [M]. Halifax: Dalhousie University Press, 2006.
- [9] Fraenkel A S. How to beat your Wythoffs games opponent on three fronts [J]. Amer Math Monthly, 1982, 89: 353-361.
- [10] Liu W A, Zhao X. Nim with one or two dynamic restrictions [J]. Discrete Applied Mathematics, 2016, 198: 48-64.
- [11] Liu W A, Li H F, Li B. A restricted version of Wythoffs game [J]. Electronic Journal of Combinatorics, 2011, 18: 545-567.
- [12] Berlekamp E R, Conway J H, Guy R K. Winning Ways for Your Mathematical Plays [D]. Pittsburgh: Academic Press, 1982.
- [13] Liu W A, Wang M Y. Multi-player subtraction games [J]. Theoretical Computer Science, 2017, 659: 14-35.

## Ring-Bounded Small Nim games

Liu Wenan, Zhou Jingjing

(College of Mathematics and Information Science, Henan Normal University, Xinxiang 453007, China)

**Abstract:** In this paper, we propose a new model "Ring-Bounded Small Nim games". The set of all  $P$ -positions is determined under the normal play convention.

**Keywords:** impartial combinatorial games; bounded; Small Nim